



Uno de los focos emisores emite lava que discurre sobre zona ya ocupada de la colada 10 en dirección a Las Manchas

Disminuye la sismicidad en ambas profundidades después de registrar una alta actividad en los últimos días

Las coladas ocupan aproximadamente 1.144 hectáreas y se calcula en 70 kilómetros las carreteras afectadas por la erupción

El Comité Director del PEVOLCA insiste en que subsiste el peligro en el área de exclusión y en las zonas evacuadas y que hay que respetar en todo momento las normas de seguridad establecidas para salvaguardar la integridad física

La actividad estrombolina en los puntos emisores del cono principal se ha concentrado en la mañana de hoy viernes en el foco situado más al sureste, desde donde ha partido una colada que discurre sobre la 10, por superficie ya ocupada, y en dirección suroeste hacia Las Manchas. Esta es la principal novedad sobre el estado de las coladas que se ha analizado hoy en el Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA), que estuvo dirigido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, director del Plan, y donde también se informó del descenso de la sismicidad en ambos niveles de profundidad y de un nuevo episodio de inflación en la deformación vertical registrado en la estación de Jedey.

Después de 75 días de la erupción continúan trabajando a pleno rendimiento todos los grupos del Plan PEVOLCA: Intervención; Logística; Rehabilitación y Servicios Esenciales, Seguridad y Sanidad, además del Comité Científico que elabora diariamente un informe, que permite la toma de decisiones en las reuniones del Comité Director.

En este sentido, el Comité Director ha insistido en recordar que subsiste el peligro en el área de exclusión y en las zonas evacuadas, y hay que respetar en todo caso y en todo momento las normas de seguridad establecidas por las autoridades para salvaguardar la integridad física, solo pudiendo acceder a dichas zonas con los permisos necesarios. En este sentido, los datos observados ayer en la medición de gases nocivos para la salud en la zona restringida obligaron al cierre de los accesos por la zona sur, situación que mejoró por la mañana pero que se complicó posteriormente por el nuevo aporte lávico hacia Las Manchas.

Sobre la evolución de las coladas, la portavoz del Comité Científico, Carmen López, explicó que la actividad eruptiva continúa concentrándose principalmente en el flanco noreste, donde la acumulación de piroclastos ha dado lugar a la formación de un cono de piroclastos con actividad estromboliana y efusiva que emite coladas lávicas. Los desprendimientos que se producen en el interior del cráter de este cono aportan bloques que son transportados por las coladas. En los focos emisores del cono principal la actividad se ha concentrado esta mañana en actividad estromboliana en uno de los focos situado más al sureste, desde donde ha partido una colada que discurre en dirección suroeste, hacia Las Manchas. En la parte más al norte, las coladas de lava se derraman en la zona del Frontón, algunas moviéndose hacia el norte afectando nuevas zonas, y otras se desplazan hacia el oeste sobre las coladas anteriores.

Al respecto, Francisco Prieto, por la Dirección Técnica del PEVOLCA, señaló que el mayor aporte de lava sigue discurriendo por la zona central principalmente sobre la colada 7, enfriándose en las zonas bajas, pero también hay avances de coladas en la zona alta tanto por el norte como por el sur. Por el norte, la lava discurre más despacio y llega hasta la carretera de Tacande, aunque sin separarse mucho de la principal, y por el sur, avanza sobre la colada 10 afectando por el momento a terreno ya ocupado. Ambos movimientos están siendo objeto de monitorización constante.



La superficie afectada se estima en unas 1.144 hectáreas, con una anchura máxima de 3.350 metros, y se calcula en 48 hectáreas la extensión de los deltas lávicos. Los datos aportados por el satélite Copernicus indican que hay aproximadamente 2.891 construcciones/edificaciones destruidas, de las cuales 2.790 están afectadas en su totalidad y 101 parcialmente.

Hay también más de 70 kilómetros de carreteras y otras vías afectadas por la lava, de los cuales 10 son carreteras insulares y el resto calles, travesías y otros viarios.

La sismicidad intermedia y profunda han descendido, después de haber registrado una gran actividad en los últimos días, sobre todo en la intermedia. La magnitud máxima ha sido 4.2 mbLg de un evento registrado hoy, a las 05:14, sentido IV (EMS), a profundidad de 13 kilómetros. El nivel del tremor se encuentra en valores medios, con pulsos puntuales.

En cuanto a la deformación, se registra un nuevo episodio de inflación en las cercanías de Jedey (estación LP03), de unos 6 cm en vertical, y estabilidad en el resto de la red, con alguna estación mostrando ligera deflación. Según la portavoz del Comité Científico, la deformación está relacionada con la alimentación del proceso eruptivo y esta estación es muy sensible por su ubicación.

La previsión meteorológica no descarta intervalos de lluvias de mayor intensidad durante la primera mitad del día y la intrusión de polvo sahariano a partir del sábado. El régimen de vientos previsto para las próximas 24 horas es favorable para la operatividad aeronáutica.

Sobre la calidad del aire, los niveles de dióxido de azufre (SO₂) tanto ayer como hoy se han mantenido en niveles buenos en todas las estaciones de la isla. En el día de hoy continúan registrándose niveles buenos en todas las estaciones.

Con respecto a las partículas menores de 10 micras (PM₁₀), durante el día de ayer se superó el valor límite diario en Los Llanos de Aridane y hoy se mantienen como regular en La Grama-Breña Alta, desfavorable en Los Llanos de Aridane, y bueno o razonablemente bueno en el resto de estaciones.

El Plan PEVOLCA sigue recomendando a la población en general el uso de mascarilla FFP2 y a la población sensible o especialmente vulnerable, reducir las actividades al aire libre. Se puede consultar toda la información actualizada en la web del Gobierno de Canarias de Calidad del Aire:

<https://www3.gobiernodecanarias.org/medioambiente/calidaddelaire/ica.do>

Sobre albergados en hoteles, hay 548 personas, seis más que ayer. Del total, 417 se hospedan en Fuencaliente y 71 en Los Llanos de Aridane y 60 en Breña Baja, gestionados por Cruz Roja y los servicios municipales. Además, hay 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares.

Dictamen diario del Comité Científico

Previamente a la reunión del Comité Director del PEVOLCA se reunió el Comité Científico del Plan, en el que sus integrantes expusieron sus conclusiones sobre la evolución del fenómeno eruptivo desde el día de ayer. Este Comité Científico está coordinado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y lo integran representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Tales conclusiones fueron:

“La erupción fisural continúa mostrando mecanismo estromboliano, esto es, un mecanismo de carácter mixto, con fases de explosividad variable que producen depósitos piroclásticos y fases efusivas que producen las coladas de



lava, de forma simultánea. El proceso eruptivo muestra episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana, así como pulsos con actividad freatomagmática.

La actividad eruptiva continúa concentrándose principalmente en el flanco NE, donde la acumulación de piroclastos ha dado lugar a la formación de un cono de piroclastos con actividad estromboliana y efusiva que emite coladas lávicas. Los desprendimientos que se producen en el interior del cráter de este cono, aportan bloques que son transportados por las coladas. En los focos emisores del cono principal la actividad se ha concentrado esta mañana en actividad estromboliana en uno de los focos situado más al SE, desde donde ha partido una colada que discurre en dirección SO, hacia Las Manchas. Las coladas de lava se derraman en la zona del Frontón, algunas moviéndose hacia el N afectando nuevas zonas, y otras se desplazan hacia el O sobre las coladas anteriores.

La altura de columna medida hoy ha sido de 1900 m, con nube de dispersión en dirección S-SO.

En niveles bajos, continúa el predominio del viento del NE con rachas que pueden alcanzar los 60-70 km/h en cumbres, El Paso y los Llanos de Aridane. El viento desde superficie hasta niveles medios troposféricos (hasta 5500 m) será del NE a componente

E. La dirección del viento esperada, produce que el penacho de cenizas y SO₂ continúe orientado hacia el SO desde el foco eruptivo. Lo anterior supone un escenario favorable para la operatividad aeronáutica. Hoy, probabilidad de lluvias débiles afectando a vertientes N y E de La Palma. A partir de mañana, se prevé que la masa de aire sahariana se desplace desde el E hacia el O sobre el archipiélago y que produzca una intrusión de polvo sahariano (afectando principalmente a las islas orientales y sin descargarse en La Palma). La entrada de polvo sahariano produciría un aumento en el PM₁₀ registrado en las estaciones de calidad del aire.

La sismicidad a profundidades intermedias ha disminuido en las últimas 24 h, localizándose en las mismas zonas. El número de sismos a profundidades superiores a 20 km ha disminuido aún más en las últimas horas. La magnitud máxima ha sido 4.2 mbLg de un evento registrado ayer, a las 21:11, sentido V (EMS), a profundidad de 11 km. El nivel del tremor se encuentra en valores medios con alta variabilidad. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo alcanzarse intensidades V-VI (en la escala de intensidad EMS) y originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente.

En cuanto a la deformación, se registra un nuevo episodio de inflación en las cercanías de Jedey (estación LP03), de unos 6 cm en vertical. Estabilidad en el resto de la red con alguna estación mostrando ligera deflación.

La emisión de dióxido de azufre (SO₂), asociada al penacho volcánico del actual proceso eruptivo en marcha (emanaciones visibles de gases volcánicos), registrada mediante el uso de sensores ópticos remotos tipo miniDOAS en posición móvil marítima durante el día de ayer (2/12) fue ALTA. La serie temporal de la emisión de dióxido de azufre (SO₂) continúa reflejando una tendencia descendente desde el pasado 23/9, cuando se registró una emisión de dióxido de azufre (SO₂) extremadamente ALTA.

En el caso de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO₂), asociada a los 220 km² de la dorsal volcánica de Cumbre Vieja (emanaciones no visibles de gases volcánicos), continúa registrando valores estables desde el pasado 15/11. Estos valores se encuentran por encima del valor promedio de los niveles de fondo (B) y durante el día de ayer (2/12) esta emisión difusa fue 5 veces el promedio de los niveles de fondo (5xB). Estas emanaciones difusas no representan un peligro para las personas, salvo que se formen acumulaciones de CO₂ en depresiones mal ventiladas, que desplacen el oxígeno del aire y se generen ambientes anóxicos. En la estación de Los Llanos de Aridane (LP10) se continúa registrando una ligera fracción magmática-hidrotérmica en el dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera del suelo, mientras que esta es prácticamente nula en la estación de Fuencaliente (LP08). Todas estas observaciones geoquímicas son coherentes con el actual proceso eruptivo.

En el día de ayer los valores de calidad del aire debida al dióxido de azufre (SO₂), contaminante asociado al proceso eruptivo, se incrementaron durante la tarde, alcanzando niveles entre razonablemente buenos y regulares en las estaciones de Tzacorte y Los Llanos de Aridane, con un valor desfavorable y superación del valor horario



(establecido en 350 µg/m³) a las 18:00 h en esta última estación. Durante la noche y madrugada de hoy se registran niveles oscilando entre razonablemente buenos y regulares en Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Puntagorda; y niveles buenos en El Paso y Fuencaliente.

Con respecto a las partículas menores de 10 micras (PM₁₀), durante el día de ayer se mantuvieron los niveles observados en el conjunto de estaciones, situándose en niveles buenos o razonablemente buenos durante toda la jornada, a excepción de un pico intenso de 418 µg/m³ en la estación de Los Llanos de Aridane, a las 14:00h, que motivó la superación del valor límite diario (establecido en 50 µg/m³). Durante la mañana de hoy, como en días anteriores, se comienza a observar un ligero aumento en los valores registrados en Los Llanos de Aridane. La media móvil de 24 horas se mantiene hoy en nivel desfavorable en Los Llanos de Aridane, y entre niveles buenos y regulares en el resto de estaciones.

Como medida de precaución, en la zona del Valle de Aridane, Tijarafe y Puntagorda, para grupos de riesgo y población sensible considere reducir todas las actividades al aire libre, y realizarlas en el interior o posponerlas hasta que la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Para población general, considere reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, especialmente si presenta tos, falta de aire o cualquier otro síntoma, y realizarlas en el interior, o las puede posponer hasta que la calidad del aire sea buena o razonablemente buena.

Consultar la web del Gobierno de Canarias de Calidad del Aire:

<https://www3.gobiernodecanarias.org/medioambiente/calidaddelaire/ica.do>

(*) Extremadamente ALTA > 50000 toneladas diarias; Muy ALTA entre 30000 y 49999 toneladas diarias; ALTA entre 1000 y 29999 toneladas diarias; MEDIA entre 100 y 999 toneladas diarias; BAJA entre 50 y 99 toneladas diarias; Muy BAJA entre 5 y 49 toneladas diarias y Extremadamente BAJA

OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES

Sigue siendo imperativo el respeto de las zonas de exclusión terrestre y marítima, para mantener la integridad física de las personas.

Se recomienda a la población en la isla de La Palma el uso de mascarillas FFP2 al aire libre.

MOVIMIENTOS SÍSMICOS:

- El comité científico del PEVOLCA realiza un seguimiento continuo de la actividad volcánica.
- Tanto en casa, como en el centro de trabajo, toma medidas preventivas: refuerza las estanterías, fija lámparas y retira objetos grandes del mobiliario.

En el exterior:

Si te encuentras en el exterior y se registra un sismo, busca un lugar abierto y aléjate de estructuras que puedan caer a la vía y de las zonas con riesgo de derrumbe.

Por tu seguridad, recuerda estos consejos de autoprotección:

- Dirígete a espacios abiertos.
- Aléjate de edificios, balcones, semáforos, farolas, tendidos eléctricos o árboles.



- No te acerques a zonas con peligro de desprendimientos.
- Sigue las recomendaciones de las autoridades e infórmate por canales oficiales y medios de comunicación.
- Si te encuentras en un vehículo, disminuye la velocidad y para el motor cuando sea posible, lejos de edificaciones y zonas escarpadas. Pon los indicadores de emergencia y permanece en el vehículo hasta que finalice el terremoto.

En el interior:

Si te sorprende un temblor en el interior de tu vivienda, mantén la calma y sigue estos consejos de autoprotección:

- Mientras dure el temblor, no salgas al exterior.
- Protégete bajo el marco de una puerta o de algún mueble sólido, como una mesa.
- No te sitúes cerca de ventanas.
- Si tienes que abandonar tu casa, desconecta agua, luz y gas.
- En caso de evacuación, baja por las escaleras y no utilices el ascensor.
- Sigue las recomendaciones de las autoridades e infórmate por canales oficiales y medios de comunicación.

CAIDA DE PIROCLASTOS:

- Se actualiza el radio de exclusión, tras valorar la actividad actual, a 2.0 km en torno a los centros de emisión para minimizar el riesgo de impacto de piroclastos y la exposición a los gases. Se utilizará como límite en el lado sur, la carretera LP-2. En el lado norte, se permitirá el acceso al núcleo de Tacande de Abajo estableciéndose el límite en el km 2.9 de la LP- 212
- En caso de intensificación de la actividad explosiva es posible que algunas detonaciones violentas puedan producir rotura del vidrio de las ventanas. Se recomienda alejarse de las ventanas hasta un radio de 5 km desde el cono.
- En las zonas afectadas por una intensa caída de cenizas (que se observe una clara deposición sobre el suelo) y más aún si se observa bruma, se recomienda mantenerse en espacios interiores. Al aire libre, se recomienda así mismo el uso de mascarillas FFP2 y de sistemas de protección de ojos.
- Se recomienda la limpieza de azoteas en las que se acumulen espesores de cenizas de varios centímetros. Se insiste en que se sigan de manera precisa el procedimiento de retirada de cenizas de azoteas y suelo indicado por Protección Civil (humedecer ceniza, protección de ojos, llevar mascarilla, proteger la piel, véase documentación anexa). Para la retirada, se deben usar mascarillas FFP2, guantes, humidificar ligeramente para su barrido y evitando el uso de sopladores, salvo para la limpieza de las instalaciones aeroportuaria por personal especializado con sus EPIs correspondientes. El uso de los sopladores aumenta la re-suspensión de las partículas más perjudiciales para la salud.
- Ante la llegada de cenizas a otras islas, se recomienda en las afectadas, el uso de mascarillas quirúrgicas.

PENACHO MARINO:



- Se sugiere prestar mucha atención al pronóstico del viento para la monitorización de los posibles cambios de dirección del penacho y actuar en consecuencia, especialmente aquellas personas con el sistema respiratorio debilitado (por ejemplo, asmáticos) ya que son más vulnerables a concentraciones más bajas.
- También se recomienda el lavado de los ojos después de cualquier exposición, ya que los síntomas, a menudo, no se perciben hasta más tarde.
- Estos penachos marinos se pueden percibir hasta varios kilómetros de distancia de la fuente, aunque más diluidos. En el caso de que el penacho marino llegue a núcleos poblacionales, se recomienda permanecer en el interior de las viviendas siempre que sea posible y cerrar todas las puertas y ventanas.
- Para la seguridad de la navegación de embarcaciones científicas que realizan labores científicas en esta área, se recomienda mantener una distancia de al menos 500 m para las zonas activas de los deltas de lava (con aporte de lava y manifestaciones visibles), reduciendo dicha distancia a 200 m para las zonas más estables. La navegación con fines científicos para la gestión de la emergencia, se puede realizar a distancias menores, bajo la responsabilidad del armador y el capitán o patrón de la embarcación, siempre y cuando se cuente con el visto bueno de la Dirección Técnica de PEVOLCA y Capitanía Marítima.

COLADAS LÁVICAS:

- También se recomienda no aproximarse a las coladas de lava por el riesgo de exponerse a los gases emitidos, posibles desprendimientos y las altas temperaturas.
- Ante los grandes espesores de colada de lava observados en algunos puntos, se pueden producir colapsos de su frente que, en zonas de mayor pendiente, pueden conllevar la formación de grandes fragmentos de colada, que pueden desprenderse del frente de la colada y que de forma repentina alcanzando distancias de varios metros desde el frente de colada, dependiendo de la topografía. También en zonas de gran pendiente, se puede producir pequeños flujos piroclásticos.

Para la seguridad de científicos en tierra dentro de la zona de exclusión se recomienda mantener una distancia de al menos 1000 m respecto al centro principal de emisión. La aproximación a distancias menores puede realizarse, con fines de observación científica para la gestión de la emergencia, con el visto bueno de la Dirección Técnica de PEVOLCA.

Se ha reforzado el seguimiento continuo de la actividad y se comunicará cualquier cambio significativo que se observe. Manténganse atentos a la información que proporcionen las correspondientes autoridades de Protección Civil".

[031221 INFORME Comité científico PEVOLCA \(PDF\)](#)